

Эндоотбеливание (осветление-отбеливание зуба изнутри).

Для процедуры **внутреннего отбеливания зубов**, удаляют старые пломбы, пораженную вторичным кариесом зубную ткань, устье корневого канала очищают от окрашивающей пасты. Иногда для достижения желаемого результата внутреннего осветления зуба проводится до 5 процедур. Былой цвет зубов позволяет вернуть эндоотбеливание, а зубному ряду - белоснежность и привлекательность, у пациента - появляется желание улыбаться.

Отбеливание зубов системой Opalescence Endo применяют при отбеливании депульпированных, потемневших зубов. Врач стоматолог заполняет **отбеливающим гелем** специально сформированную полость внутри зуба и устанавливает временную пломбу. После 2ух недель процедуру заполнения осветляющим гелем повторяют - извлекая старый препарат и вводят новый. По прошествии слующих двух недель извлекают отбеливающий гель, восстанавливают полость пломбировочным материалом. Данный метод отличает от других - уникальность и избирательность воздействия, и возможность отбеливать единичные зубы изменившие свой цвет из-за эндодонтического лечения.



Процесс отбеливания "мертвых" (депульпированных) зубов заключается в использовании осветляющих

Показания к применению внутриканального отбеливания депульпированных зубов:

- окрашивание твердых тканей зуба, исходящий из полости зуба
- окрашивание твердых тканей зуба, не поддающиеся поверхностному отбеливанию
- окрашивания дентина зуба

Противопоказания для эндоотбеливания депульпированных зубов:

- окрашивание эмали зубов. (Эндоотбеливание может оказаться не эффективным, если краситель, окрасивший ткани дентина будет устойчив к отбеливателю.)
- наличие кариеса
- измененный цвет старых композитных реставраций (т.к. любое отбеливание зубов подразумевает химическое разрушение белковых! красителей. В случае использования искусственных красителей, химическое отбеливание которых данной методикой будет безуспешным. При этом в настоящее время часто отказываются отбеливать девитальные зубы, по причине неэффективности (т.к. окраска этих зубов в основе зарождается от внутриканальных пломбировочных материалов, а там совершенно др. группы красителей).

Вторая причина серьёзного ослабления прочности оставшихся тканей зуба, (т.к. в "мертвом" зубе постотбеливающие поражения не восстанавливаются).

- пародонтит (после лечения пародонтоза появляется возможность отбеливания некоторыми способами);
- возраст пациента до 16 лет (не полностью сформированная зубная ткань);
- беременность, период лактации (возможно альтернативное отбеливание зубов методом Air Flow);
- аллергическая реакция на перекись водорода (противопоказаны методы отбеливания, при которых используется перекись водорода);
- повышенная чувствительность зубов.

В чем заключается метод внутриканального отбеливания депульпированных зубов?

Метод проведения внутриканального отбеливания депульпированных зубов, изменивших цвет в следствие проведения эндодонтического лечения:

- Перед процедурой "внутриканальное отбеливание зубов" стоматолог проводит осмотр, выявляя причины изменения цвета зубов. Проводится рентгенологическое обследование для оценки качества проведенного эндодонтического лечения зубов.
- В дальнейшем врач-стоматолог удаляет старую пломбу для доступа к корневому каналу. Устья каналов изолируются прокладкой из ионамерного цемента, которая недопускает проникновение отбеливающего геля в корневые каналы зубов.
- Заранее подготовленную полость заполняют отбеливающим гелем и устанавливают временную пломбу.

Через две недели пациента проходит контрольный осмотр.

Метод внутриканального отбеливания зубов абсолютно безболезнен и очень эффективен!

Проконсультируйтесь у специалистов. Наши врачи стоматологи определяют: возможность отбеливания цвета зуба методом **эндоотбеливания**, тем самым отдаляя более глобальное вмешательство - протезирование.